

SGLT2-remmers

1 maart 2024

© Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg

Hoe worden SGLT2-remmers terugbetaald in België?

- a. Bij chronische nierinsufficiëntie kan enkel Forxiga terugbetaald worden en dan alleen onder bepaalde voorwaarden.
- b. Voor hartfalen kan de eerste aanvraag tot terugbetaling enkel door een cardioloog, een internist of een geriater gebeuren.
- c. Voor hartfalen kan enkel Forxiga terugbetaald worden en dan alleen onder bepaalde voorwaarden.
- d. Ondanks het bewezen nierprotectieve effect is de terugbetaling voor diabetes type 2 gebaseerd op onder meer de eGFR-waarde.

Richtlijnen en consensusverklaringen stellen dat SGLT2-remmers gebruikt moeten worden bij alle mensen met diabetes type 2 met een hoog cardiovasculair risico (in het bijzonder hartfalen) en/of chronisch nierlijden. De belangrijkste vraag is niet langer of een bepaalde patiënt in aanmerking komt voor SGLT2-remmers, maar of er een tegenaanwijzing is hiervoor, zoals een voorgeschiedenis van vaak voorkomende genitale schimmelinfecties en/of (euglykemische) DKA. Zelfs in dat laatste geval is men steeds meer geneigd tot de herintroductie van SGLT2-remmers in het therapieschema, mits adequate counseling aangezien de voordelen ervan de risico's veruit overtroeven.

Rekening houdend met de nieuwe ADA/EASD-consensus van 2022 voor de behandeling van hyperglykemie bij diabetes type 2 is een proactieve aanpak vereist om SGLT2-remmers toe te voegen aan het therapieschema van deze patiënten. Eveneens pleit de consensus voor vroegtijdige combinatietherapie ter preventie van therapeutisch falen en therapeutische traagheid, met een plaats voor SGLT2-remmers als goede en veilige glucoseverlagende medicijnen.

Hoewel de producten in België beschikbaar zijn, zijn ze nog niet terugbetaald voor alle patiënten die hieruit voordeel zouden kunnen halen. Gezien de belangrijke reductie in het gebruik van resources door hospitalisaties en door achteruitgang van de nierfunctie kan een verdere uitbreiding van de

terugbetalingscriteria in de toekomst toelaten om meer mensen te beschermen. Eveneens is er nood aan het uniformiseren van de terugbetalingscriteria per indicatie en over de verschillende producten heen (niet langer individueel per product) aangezien er duidelijk sprake is van een klasse-effect.

Meer weten over dit onderwerp?

Bekijk dan de oorspronkelijke bijdrage in TvGG:

[Klassieke psychedelica: veiligheid, neveneffecten en medicatie-interacties](#)

Auteur(s): C. GELEYN, K. KUYPERS, M. SEYNAEVE, G. LEMMENS

DOI: 10.47671/TVG.79.23.049

Deze publicatie bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische ontwerpen, tekst, lettertypen en andere informatie (hierna "Inhoud" genoemd). Deze publicatie en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Tijdschrift voor Geneeskunde vzw. Alle rechten op deze Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren, of gebruiken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Tijdschrift voor Geneeskunde vzw.