

Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd

26 november 2024

© Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg

Wat is de klinische presentatie van acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd?

- a. Hoge koorts
- b. Jeukklachten staan op de voorgrond
- c. Pitting oedeem
- d. De letsels zijn symmetrisch verdeeld

Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd (AHOK), ook wel de 'ziekte van Finkelstein' of het 'syndroom van Seidlmayer' genoemd, is een vorm van een acute cutane leukocytoclastische small-vessel vasculitis. De aandoening doet zich voor bij kinderen tussen 4 en 24 maanden en zou vaker voorkomen bij jongens. De etiologie van de aandoening is niet gekend. AHOK zou in 75% van de gevallen optreden na een infectie, in relatie tot medicatie of vaccinatie.

De klinische presentatie van AHOK kenmerkt zich door de triade van lichte koorts, oedeem en grote palpabele purpura. Typisch voor AHOK is het contrast tussen de zorgwekkende huidmanifestaties en de goede algemene klinische toestand van de patiënt. Jeuk is vaak afwezig.

Het oedeem bij AHOK is typisch non-pitting en tast hoofdzakelijk de extremiteiten aan, voornamelijk de hand- en de voetruggen. Oedeem van het gezicht, de oogleden en de oren kan eveneens optreden en in zeldzame gevallen is er ook oedeem van het scrotum aanwezig. Het oedeem is typisch asymmetrisch en kan pijnlijk zijn. De ellebogen en de knieën kunnen eveneens aangetast zijn.

De morfologie van de huidlaesies bij AHOK bestaat uit typisch targetoïde of rozetvormige purpura en/of ecchymosen. De laesies veranderen niet binnen enkele uren van locatie. Voornamelijk de extremiteiten zijn aangetast, maar ook ter hoogte van de oren, de kin, de oogleden en de scrotale regio kunnen er

huidafwijkingen optreden. De letsels zijn symmetrisch verdeeld. De thorax is typisch niet aangetast. De laesies kunnen evolueren naar blaren en op de oren zelfs naar oppervlakkige necrose. Er is geen aantasting van de mucosa en er zijn geen krabletsels.

AHOK is een zelflimiterende aandoening. Het is belangrijk om tijdig de diagnose te stellen om onnodige onderzoeken en therapieën te voorkomen. AHOK is een klinische diagnose waarbij, met uitzondering van een urinesediment met controle bij een afwijkend resultaat, verdere aanvullende onderzoeken, zoals een bloedafname en een huidbiopsie, onnodig zijn. Het is belangrijk om bedacht te blijven op zeldzame, maar mogelijk ernstige complicaties, zoals het compartimentsyndroom en invaginaties.



Meer weten over dit onderwerp?

Bekijk dan de oorspronkelijke bijdrage in TvGG:

[Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd bij een 9 maanden oude jongen](#)

Auteur(s): P. VAN WESEMAEL, S. DE SCHRYVER

DOI: 10.47671/TVG.80.24.070

Deze publicatie bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische ontwerpen, tekst, lettertypen en andere informatie (hierna "Inhoud" genoemd). Deze publicatie en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Tijdschrift voor Geneeskunde vzw. Alle rechten op deze Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren, of gebruiken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Tijdschrift voor Geneeskunde vzw.